

ਐਡਵਿਲ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਸਾਈਨਸ ਫੋਟੀਆ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਕੂਈ-ਜੈਲ



ਸਰਗਰਮ ਅੰਸ਼
 - ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫੇਨ 200ਮਿ.ਗ੍ਰ.
 - ਸੂਡੋਇਫੇਡ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ 30ਮਿ.ਗ੍ਰ.

ਵਰਤੋਂ

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਰਾਹਤ ਲਈ:

- ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ
- ਸ਼ਰੀਰ ਦਰਦ ਕਰਨਾ
- ਸਾਈਨਸ ਦਾ ਦਰਦ
- ਗਲ ਦੁਖਣਾ
- ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ
- ਬੁਖਾਰ

ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਬਾਲਗ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ: ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 1 ਜਾਂ 2 ਫੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਲਿਕੂਈ-ਜੈਲ ਲਵੋ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਫੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਲਿਕੂਈ-ਜੈਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲਵੋ।

• ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ

ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਰੁੱਖ ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਉ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਟਿਲਸੈਲੀਸਲਿਕ ਐਸਿਡ (ਏ.ਐੱਸ.ਏ.) ਜਾਂ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ.ਐੱਸ.ਏ., ਸੈਲੀਸਾਈਕਲੋਟਾਂ ਜਾਂ ਸੋਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡਵਿਲ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਸਾਈਨਸ (Advil Cold & Sinus) ਨਾ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਸੂਗਰ, ਦਿਲ ਜਾਂ ਬਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ, ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ, ਵਿੱਡ ਵਿੱਚ ਅਲਸਰ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਡਵਿਲ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਸਾਈਨਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਉ। ਖੂਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਨੋਆਮੀਨ ਆਕਸੀਡੇਜ਼-ਰੋਕੂ (ਐੱਮ.ਏ.ਓ.ਆਈ.) ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੈਣ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਤਾਪ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਇ ਲਓ।

ਜੇ ਐਡਵਿਲ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਸਾਈਨਸ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਤ ਦਰਦ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਅਫ਼ਾਰਾ, ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ ਹੋਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂ-ਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਣਾ, ਘਬਰਾਹਟ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਘਮੇਰ ਆਉਣਾ, ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਤਰਲ ਵਧ ਜਾਣਾ, ਖਾਜ ਹੋਣਾ, ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਉੱਭਰ ਪੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ।

ਫੋਟੀਆ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਜੋ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ
 ਐਸਿਟਿਲੋਟਿਓ ਮੋਨੋਗਲਿਸਰਾਈਡਾਂ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਆਕਸਾਈਡ, ਕੈਰਾਨਾਉਬਾ ਮੋਮ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾਸਤਾ, ਕ੍ਰੋਸਕਾਰਮੈਲੋਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ, ਈਥੋਕਸੀਈਥੇਨਲ, ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡਾਂ, ਲੈਸਿਥਿਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰਿਸਟੇਲਾਈਨ ਸੈਲੂਲੋਜ਼, ਪੈਰਾਬੈਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੈੱਲਕ, ਪੋਵੀਡੋਨ, ਪੀ-ਜਿਲੈਟੀਨਾਈਜ਼ਡ ਨਸ਼ਾਸਤਾ, ਪ੍ਰੋਪਾਈਲਿਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਸਿਲੀਕਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਸਿਮੋਥੀਕੋਨ, ਸੋਡੀਅਮ ਬੈਜ਼ੋਏਟ, ਸੋਡੀਅਮ ਲਾਇਰਿਲ ਸਲਫੇਟ, ਸਟੀਅਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਸਿਊਕਰੋਜ਼, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ।

ਲਿਕੂਈ-ਜੈਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਜੋ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ
 ਡੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਯੈਲੋ ਨੰਬਰ 10, ਐੱਫ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਯੈਲੋ ਨੰਬਰ 40, ਫੈਕਸੋਨੇਟਿਡ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ, ਜੈਲੇਟਿਨ, ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਪੌਲੀਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਪੌਲੀਵਾਈਨਿਲ ਐਸੀਟੇਟ ਬੈਲੇਟ, ਪੌਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ, ਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਸੁੱਧ ਕੀੜਾ ਪਾਣੀ, ਸੋਰਬੀਟੋਨ, ਸੋਰਬੀਟੋਲ।

ਲਿਕੂਈ-ਜੈਲ (Liqui-Gels®) ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰਾਦਮਾਰਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ।

ਐਡਵਿਲ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਸਾਈਨਸ ਪਲੱਸ



ਸਰਗਰਮ ਅੰਸ਼
 - ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫੇਨ 200ਮਿ.ਗ੍ਰ.
 - ਸੂਡੋਇਫੇਡ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ 30ਮਿ.ਗ੍ਰ.
 - ਕਲੋਰੋਫੈਨੀਰਾਮੀਨ ਮੈਲੀਏਟ 2ਮਿ.ਗ੍ਰ.

ਵਰਤੋਂ

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸਾਈਟਿਸ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਰਾਹਤ ਲਈ:

- ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ
- ਸ਼ਰੀਰ ਦਰਦ ਕਰਨਾ
- ਸਾਈਨਸ ਦਾ ਦਰਦ
- ਨੱਕ ਵਗਣਾ
- ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ
- ਨਿੱਛਾਂ ਆਉਣਾ
- ਗਲ ਦੁਖਣਾ
- ਗਲ ਵਿੱਚ ਖੁਰਕ ਹੋਣਾ

ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਬਾਲਗ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ: ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 1 ਜਾਂ 2 ਐਡਵਿਲ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਸਾਈਨਸ ਪਲੱਸ (Advil Cold & Sinus PLUS) ਗੋਲੀਆਂ ਲਵੋ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਐਡਵਿਲ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਸਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲਵੋ।

• ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ

ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਰੁੱਖ ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਉ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਟਿਲਸੈਲੀਸਲਿਕ ਐਸਿਡ (ਏ.ਐੱਸ.ਏ.) ਜਾਂ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ.ਐੱਸ.ਏ., ਸੈਲੀਸਾਈਕਲੋਟਾਂ ਜਾਂ ਸੋਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡਵਿਲ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਸਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਨਾ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਗਰ, ਦਿਲ ਜਾਂ ਬਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਖੂਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ, ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ, ਪੈਪਟਿਕ ਅਲਸਰ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਡਵਿਲ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਸਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਉ। ਖੂਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਨੋਆਮੀਨ ਆਕਸੀਡੇਜ਼-ਰੋਕੂ (ਐੱਮ.ਏ.ਓ.ਆਈ.), ਹੋਰ ਹਿਸਟੇਮਾਈਨ-ਵਿਰੋਧੀ, ਟਿਕਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਤਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੈਣ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਤਾਪ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਇ ਲਓ।

ਜੇ ਐਡਵਿਲ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਸਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਤ ਦਰਦ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਅਫ਼ਾਰਾ, ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ ਹੋਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂ-ਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਣੀ, ਘਬਰਾਹਟ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਘਮੇਰ ਆਉਣੀ, ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਤਰਲ ਵਧ ਜਾਣਾ, ਖਾਜ ਹੋਣਾ, ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਉੱਭਰ ਪੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਉੱਭਰਨ।

ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਜੋ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਟ੍ਰਿਟਾਨੋਮਿ ਟਾਈਟਾਈਡ, ਕੈਰਾਨਾਉਬਾ ਮੋਮ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾਸਤਾ, ਕ੍ਰੋਸਕਾਰਮੈਲੋਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ, ਐੱਫ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਯੈਲੋ ਨੰਬਰ 40, ਐੱਫ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਯੈਲੋ ਨੰਬਰ 6, ਗਲਿਸਰਿਲ ਬੈਰੀਨੋਟ, ਹਾਈਪੋਮੇਲੋਜ਼, ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰਿਸਟੇਲਾਈਨ ਸੈਲਿਊਲੋਜ਼, ਪੌਲੀਡੈਕਸਟ੍ਰੇਜ਼, ਪੌਲੀਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਪੀ-ਜਿਲੈਟੀਨਾਈਜ਼ਡ ਨਸ਼ਾਸਤਾ, ਪ੍ਰੋਪਾਈਲਿਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਸਿਲੀਕਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ।

ਐਡਵਿਲ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਸਾਈਨਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਲਈ ਸਹੂਲਤਮੰਦ ਪੈਕਟ



ਸਰਗਰਮ ਅੰਸ਼
ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ: - ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫੇਨ 200ਮਿ.ਗ੍ਰ.
 - ਸੂਡੋਇਫੇਡ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ 30ਮਿ.ਗ੍ਰ.
ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ: - ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫੇਨ 200ਮਿ.ਗ੍ਰ.
 - ਸੂਡੋਇਫੇਡ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ 30ਮਿ.ਗ੍ਰ.
 - ਕਲੋਰੋਫੈਨੀਰਾਮੀਨ ਮੈਲੀਏਟ 2ਮਿ.ਗ੍ਰ.

ਵਰਤੋਂ

ਐਡਵਿਲ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਸਾਈਨਸ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਲਈ: ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਲ-ਜ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਰਾਹਤ ਲਈ: ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ:

- ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ
- ਸ਼ਰੀਰ ਦਰਦ ਕਰਨਾ
- ਸਾਈਨਸ ਦਾ ਦਰਦ
- ਨੱਕ ਵਗਣਾ
- ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ
- ਨਿੱਛਾਂ ਆਉਣਾ
- ਗਲ ਦੁਖਣਾ
- ਗਲ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ

ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਬਾਲਗ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ: ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 1 ਜਾਂ 2 ਐਡਵਿਲ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਸਾਈਨਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ (Advil Cold & Sinus Daytime ਜਾਂ Nighttime) ਫੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਵੋ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਐਡਵਿਲ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਸਾਈਨਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲਵੋ।

• ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ

ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਰੁੱਖ ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਉ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਟਿਲਸੈਲੀਸਲਿਕ ਐਸਿਡ (ਏ.ਐੱਸ.ਏ.) ਜਾਂ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ.ਐੱਸ.ਏ., ਸੈਲੀਸਾਈਕਲੋਟਾਂ ਜਾਂ ਸੋਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡਵਿਲ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਸਾਈਨਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਗਰ, ਦਿਲ ਜਾਂ ਬਾਇਰਾਇਡ, ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਫੋਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ, ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ, ਪੈਪਟਿਕ ਅਲਸਰ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਡਵਿਲ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਸਾਈਨਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਉ। ਖੂਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਨੋਆਮੀਨ ਆਕਸੀਡੇਜ਼ ਰੋਕੂ (ਐੱਮ.ਏ.ਓ.ਆਈ.) ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੈਣ। ਐਡਵਿਲ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਸਾਈਨਸ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿਸਟੇਮਾਈਨ-ਵਿਰੋਧੀ, ਟਿਕਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਤਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਇ ਲਓ। ਸੂਰਾਬ ਵਾਲੇ ਪੇਟ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ, ਮੋਟਰ ਗੰਡੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਿੱਧੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਜੋ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ
 ਐਸਿਟਿਲੋਟਿਓ ਮੋਨੋਗਲਿਸਰਾਈਡਾਂ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਆਕਸਾਈਡ, ਕੈਰਾਨਾਉਬਾ ਮੋਮ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾਸਤਾ, ਕ੍ਰੋਸਕਾਰਮੈਲੋਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ, ਈਥੋਕਸੀਈਥੇਨਲ, ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡਾਂ, ਲੈਸਿਥਿਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰਿਸਟੇਲਾਈਨ ਸੈਲੂਲੋਜ਼, ਪੈਰਾਬੈਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੈੱਲਕ, ਪੋਵੀਡੋਨ, ਪੀ-ਜਿਲੈਟੀਨਾਈਜ਼ਡ ਨਸ਼ਾਸਤਾ, ਪ੍ਰੋਪਾਈਲਿਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਸਿਲੀਕਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਸਿਮੋਥੀਕੋਨ, ਸੋਡੀਅਮ ਬੈਜ਼ੋਏਟ, ਸੋਡੀਅਮ ਲਾਇਰਿਲ ਸਲਫੇਟ, ਸਟੀਅਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਸਿਊਕਰੋਜ਼, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ।

ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਜੋ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ
 ਕੈਰਾਨਾਉਬਾ ਮੋਮ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾਸਤਾ, ਕ੍ਰੋਸਕਾਰਮੈਲੋਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ, ਐੱਫ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਯੈਲੋ ਨੰਬਰ 40, ਐੱਫ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਯੈਲੋ ਨੰਬਰ 6, ਗਲਿਸਰਿਲ ਬੈਰੀਨੋਟ, ਹਾਈਪੋਮੇਲੋਜ਼, ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰਿਸਟੇਲਾਈਨ ਸੈਲਿਊਲੋਜ਼, ਪੌਲੀਡੈਕਸਟ੍ਰੇਜ਼, ਪੌਲੀਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਪੀ-ਜਿਲੈਟੀਨਾਈਜ਼ਡ ਨਸ਼ਾਸਤਾ, ਪ੍ਰੋਪਾਈਲਿਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਸਿਲੀਕਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਟ੍ਰਿਟਾਨੋਮਿ ਟਾਈਟਾਈਡ।