



ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਵਿਲ

8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ



**ਐਡਵਿਲ ਪਿਡਿਆਟ੍ਰਿਕ
ਕ੍ਰੌਪਸ**
ਆਈਬੁਫੇਨ 200 ਮਿਗ੍ਰਾ. / 5 ਮਿਲੀ.

**ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਡਵਿਲ
ਸਸਪੇਂਸ਼ਨ**
ਆਈਬੁਫੇਨ 100 ਮਿਗ੍ਰਾ. / 5 ਮਿਲੀ.

**ਜੁਨੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈੱਚ ਐਡਵਿਲ
ਚਿਉਇੰਗਲਸ**
ਆਈਬੁਫੇਨ 100 ਮਿਗ੍ਰਾ. / ਟੈਬਲੇਟ

ਉਮਰ	ਵਜ਼ਨ		ਖੁਰਾਕ			
	ਕਿਗ੍ਰਾ.	ਪਾਊਂਡ	ਮਿਲੀ.	ਮਿਲੀ.	ਫ਼ਟਾ ਚੱਮਚ	ਤਾਲਿਕਾ
0 - 3 ਮਹੀਨੇ	2.5 - 5.4	5.5 - 11.9	ਆਪਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ	—	—	—
4 - 11 ਮਹੀਨੇ	5.5 - 7.9	12 - 17.5	1.0 ਮਿਲੀ.	—	—	—
12 - 23 ਮਹੀਨੇ	8.0 - 10.8	18 - 23	1.4 ਮਿਲੀ.	—	—	—
2 - 3 ਵਰ੍ਹੇ	10.9 - 15.9	24 - 35	3.0 ਮਿਲੀ.	6.0 ਮਿਲੀ.	1¼ ਫ਼ਟਾ ਚੱਮਚ	1
4 - 5 ਵਰ	16.0 - 21.3	36 - 47	—	10 ਮਿਲੀ.	2 ਫ਼ਟਾ ਚੱਮਚ	1 ½
6 - 8 ਵਰ	21.4 - 26.7	48 - 59	—	12.5 ਮਿਲੀ.	2 ½ ਫ਼ਟਾ ਚੱਮਚ	2
9 - 10 ਵਰ	26.8 - 32.5	60 - 71	—	15.0 ਮਿਲੀ.	3 ਫ਼ਟਾ ਚੱਮਚ	2 ½
11 - 12 ਵਰ	32.6 - 43.0	72 - 95	—	19.0 ਮਿਲੀ.	3 ¾ ਫ਼ਟਾ ਚੱਮਚ	3
<p>ਸ਼ੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹਵੇ, ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਵਜ਼ਨ, ਜਾਂ ਉਮਰ ਵਰਤੋ। ਕਿਸੇ ਡਾੱਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਵੱਧਾਓ। ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।</p>			<p>ਹਰ 6-8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਦ ਖੁਰਾਕ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੱਕ</p>	<p>ਹਰ 6-8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਦ ਖੁਰਾਕ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੱਕ</p>	<p>ਹਰ 6-8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਦ ਖੁਰਾਕ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4 ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੱਕ</p>	

ਐਡਵਿਲ ਪਿਡਿਆਟ੍ਰਿਕ ਕ੍ਰੌਪਸ

ਐਡਵਿਲ ਪਿਡਿਆਟ੍ਰਿਕ ਕ੍ਰੌਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ, ਕੰਨ ਦੇ ਦਰਦ, ਜੁਖਮ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਨ।

● **ਸਾਵਧਾਨੀ:** ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲਟੀ, ਦਸਤ ਜਾਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਜਲ (ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਲ ਦੀ ਘਾਟ) ਹੋ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਧਾਓ।

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਐਸੇਟਾਇਲਸੈਲੀਸਾਈਕਲਿਕ ਐਸਿਡ (ਏਐਸਏ) ਜਾਂ ਆਈਬੂਫੇਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤਪਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਏਐਸਏ, ਦੂਜੇ ਸੈਲੀਸਾਈਕਲੇਟ ਜਾਂ ਜਲਨ ਰੁਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ (ਸਾਂਝੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅੰਖਣ, ਸੁਜਨ, ਪਿੱਤ, ਸਦਮਾ) ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੁਣ। ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੈਕੇਟ ਵੇਖੋ।

(ਭਾਈ ਮੁਕਤ)

ਗੈਰ-ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਤੱਤ: ਬਣਾਵਟੀ ਫਲੇਵਰ, ਸਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਡਿਸਟੀਲਡ ਈਥੀਲੀਏ, ਗਲਿਸਰਿਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੇਲੂਲੋਸ, ਪੌਲੀਸੋਰਬੇਟ 80, ਸੁਡੀਯਮ ਬੇਨਜ਼ੋਟ, ਸੁਡੀਯਮ ਕਾਰਬੋਕਸੀਮਿਥਾਈਲਮੇਲੂਲੋਸ, ਸੁਰਬੀਟਲ, ਸਕਰੋਸ, ਪਾਣੀ, ਜੈਨਥਨ ਗਮ।

(ਫਲ)

ਗੈਰ-ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਤੱਤ: ਬਣਾਵਟੀ ਫਲੇਵਰ, ਸਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਡਿਸਟੀਲਡ ਈਥੀਲੀਏ, ਗਲਿਸਰਿਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੇਲੂਲੋਸ, ਪੌਲੀਸੋਰਬੇਟ 80, ਸੁਡੀਯਮ ਬੇਨਜ਼ੋਟ, ਸੁਡੀਯਮ ਕਾਰਬੋਕਸੀਮਿਥਾਈਲਮੇਲੂਲੋਸ, ਸੁਰਬੀਟਲ, ਸਕਰੋਸ, ਪਾਣੀ, ਜੈਨਥਨ ਗਮ।

(ਅੰਗੂਰ)

ਗੈਰ-ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਤੱਤ: ਬਣਾਵਟੀ ਫਲੇਵਰ, ਸਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਡਿਸਟੀਲਡ ਈਥੀਲੀਏ, ਐਫ਼ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ ਨੀਲਾ ਸੰਖਿਆ 1, ਐਫ਼ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ ਲਾਲ ਸੰਖਿਆ 40, ਗਲਿਸਰਿਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੇਲੂਲੋਸ, ਪੌਲੀਸੋਰਬੇਟ 80, ਸੁਡੀਯਮ ਬੇਨਜ਼ੋਟ, ਸੁਡੀਯਮ ਕਾਰਬੋਕਸੀਮਿਥਾਈਲਮੇਲੂਲੋਸ, ਸੁਰਬੀਟਲ, ਸਕਰੋਸ, ਪਾਣੀ, ਜੈਨਥਨ ਗਮ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਡਵਿਲ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਵਿਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਖਮ, ਗਲੇ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

● **ਸਾਵਧਾਨੀ:** ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲਟੀ, ਦਸਤ ਜਾਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਜਲ (ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਲ ਦੀ ਘਾਟ) ਹੋ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਧਾਓ।

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਐਸੇਟਾਇਲਸੈਲੀਸਾਈਕਲਿਕ ਐਸਿਡ (ਏਐਸਏ) ਜਾਂ ਆਈਬੂਫੇਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤਪਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਏਐਸਏ, ਦੂਜੇ ਸੈਲੀਸਾਈਕਲੇਟ ਜਾਂ ਜਲਨ ਰੁਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ (ਸਾਂਝੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅੰਖਣ, ਸੁਜਨ, ਪਿੱਤ, ਸਦਮਾ) ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੁਣ। ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੈਕੇਟ ਵੇਖੋ।

(ਭਾਈ ਮੁਕਤ)

ਗੈਰ-ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਤੱਤ: ਬਣਾਵਟੀ ਫਲੇਵਰ, ਸਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਡਿਸਟੀਲਡ ਈਥੀਲੀਏ, ਗਲਿਸਰਿਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੇਲੂਲੋਸ, ਪੌਲੀਸੋਰਬੇਟ 80, ਸੁਡੀਯਮ ਬੇਨਜ਼ੋਟ, ਸੁਡੀਯਮ ਕਾਰਬੋਕਸੀਮਿਥਾਈਲਮੇਲੂਲੋਸ, ਸੁਰਬੀਟਲ, ਸਕਰੋਸ, ਪਾਣੀ, ਜੈਨਥਨ ਗਮ।

(ਫਲ)

ਗੈਰ-ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਤੱਤ: ਬਣਾਵਟੀ ਫਲੇਵਰ, ਸਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਡਿਸਟੀਲਡ ਈਥੀਲੀਏ, ਐਫ਼ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ ਲਾਲ ਸੰਖਿਆ 40, ਗਲਿਸਰਿਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੇਲੂਲੋਸ, ਪੌਲੀਸੋਰਬੇਟ 80, ਸੁਡੀਯਮ ਬੇਨਜ਼ੋਟ, ਸੁਡੀਯਮ ਕਾਰਬੋਕਸੀਮਿਥਾਈਲਮੇਲੂਲੋਸ, ਸੁਰਬੀਟਲ, ਸਕਰੋਸ, ਪਾਣੀ, ਜੈਨਥਨ ਗਮ।

(ਅੰਗੂਰ)

ਗੈਰ-ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਤੱਤ: ਸਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਡਿਸਟੀਲਡ ਈਥੀਲੀਏ, ਐਫ਼ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ ਨੀਲਾ ਸੰਖਿਆ 1, ਐਫ਼ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ ਲਾਲ ਸੰਖਿਆ 40, ਬਣਾਵਟੀ ਫਲੇਵਰ, ਗਲਿਸਰਿਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੇਲੂਲੋਸ, ਪੌਲੀਸੋਰਬੇਟ 80, ਸੁਡੀਯਮ ਬੇਨਜ਼ੋਟ, ਸੁਡੀਯਮ ਕਾਰਬੋਕਸੀਮਿਥਾਈਲਮੇਲੂਲੋਸ, ਸੁਰਬੀਟਲ, ਸਕਰੋਸ, ਪਾਣੀ, ਜੈਨਥਨ ਗਮ।

(ਨੀਲੀ ਰਸਭਰੀ)

ਗੈਰ-ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਤੱਤ: ਸਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਡਿਸਟੀਲਡ ਈਥੀਲੀਏ, ਐਫ਼ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ ਨੀਲਾ ਸੰਖਿਆ 1, ਗਲਿਸਰਿਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੇਲੂਲੋਸ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟੀ ਫਲੇਵਰ, ਪੌਲੀਸੋਰਬੇਟ 80, ਸੁਡੀਯਮ ਬੇਨਜ਼ੋਟ, ਸੁਡੀਯਮ ਕਾਰਬੋਕਸੀਮਿਥਾਈਲਮੇਲੂਲੋਸ, ਸੁਡੀਯਮ ਸਿਟਰੇਟ, ਸੁਰਬੀਟਲ, ਸਕਰੋਸ, ਪਾਣੀ, ਜੈਨਥਨ ਗਮ।

ਜੁਨੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਬ ਐਡਵਿਲ ਚਿਉਏਬਲਸ

ਜੁਨੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਬ ਐਡਵਿਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ, ਕੰਨ ਦੇ ਦਰਦ, ਜੁਖਮ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

● **ਸਾਵਧਾਨੀ:** ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲਟੀ, ਦਸਤ ਜਾਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਜਲ (ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਲ ਦੀ ਘਾਟ) ਹੋ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਧਾਓ।

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਐਸੇਟਾਇਲਸੈਲੀਸਾਈਕਲਿਕ ਐਸਿਡ (ਏਐਸਏ) ਜਾਂ ਆਈਬੂਫੇਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤਪਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਏਐਸਏ, ਦੂਜੇ ਸੈਲੀਸਾਈਕਲੇਟ ਜਾਂ ਜਲਨ ਰੁਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ (ਸਾਂਝੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅੰਖਣ, ਸੁਜਨ, ਪਿੱਤ, ਸਦਮਾ) ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੁਣ। ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੈਕੇਟ ਵੇਖੋ।

(ਫਲ)

ਗੈਰ-ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਤੱਤ: ਐਸਪਾਰਟੇਮ, ਸੇਲੂਲੋਸ ਐਸੀਟੇਟ ਬੈਲੇਟ, ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ ਲਾਲ ਸੰਖਿਆ 27 ਲੋਕ, ਐਫ਼ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ ਲਾਲ ਸੰਖਿਆ 40 ਲੋਕ, ਜੇਲਾਟਿਨ, ਮੈਗਨਾਸਵੀਟ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਯਮ ਸਟੀਯਰੇਟ, ਮੈਨੀਟੋਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੇਲੂਲੋਸ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟੀ ਫਲੇਵਰ, ਸਿਲੀਕਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਸੁਡੀਯਮ ਸਟਾਰਚ ਗਲਾਇਕੋਲੇਟ।

(ਅੰਗੂਰ)

ਗੈਰ-ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਤੱਤ: ਐਸਪਾਰਟੇਮ, ਸੇਲੂਲੋਸ ਐਸੀਟੇਟ ਬੈਲੇਟ, ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ ਲਾਲ ਸੰਖਿਆ 30 ਲੋਕ, ਐਫ਼ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ ਲਾਲ ਸੰਖਿਆ 2 ਲੋਕ, ਜੇਲਾਟਿਨ, ਮੈਗਨਾਸਵੀਟ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਯਮ ਸਟੀਯਰੇਟ, ਮੈਨੀਟੋਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੇਲੂਲੋਸ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟੀ ਫਲੇਵਰ, ਸਿਲੀਕਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਸੁਡੀਯਮ ਸਟਾਰਚ ਗਲਾਇਕੋਲੇਟ।