

# Tableau des doses d'Advil pour les enfants et les nourrissons

Vous souhaitez obtenir un soulagement efficace pour votre enfant? Trouvez la bonne dose en utilisant le tableau ci-dessous.




Veillez lire l'étiquette pour obtenir des renseignements complets sur le produit

## Gouttes pédiatriques Advil

### Posologie habituelle :

Bien agiter avant l'emploi. Utiliser uniquement avec la seringue pour administration orale fournie avec le produit. Chacune des doses ci-dessous peut être administrée toutes les 6 à 8 heures, jusqu'à concurrence de 3 doses par jour, tant que les symptômes persistent, ou suivant les recommandations du médecin. Dans la mesure du possible, se fier au poids plutôt qu'à l'âge. Ne pas utiliser plus de 3 jours pour la fièvre ou plus de 5 jours pour soulager la douleur.

Ne pas utiliser plus que la quantité recommandée.

Âge	Poids		Posologie	
	(kg)	(lb)		
0-3 mois	2,5-5,4	5,5-11,9	Consultez un médecin	
4-11 mois	5,5-7,9	12-17,5	1 mL	
12-23 mois	8,0-10,8	18-23	1,4 mL	
2-3 ans	10,9-15,9	24-35	3 mL	






# Tableau des doses d'Advil pour les enfants et les nourrissons

## Advil pour enfants suspension orale

### Posologie habituelle :

Agiter vigoureusement avant l'utilisation. Chacune des doses ci-dessous peut être administrée toutes les 6 à 8 heures, jusqu'à concurrence de 3 doses par jour, tant que les symptômes persistent, ou suivant les recommandations du médecin. Dans la mesure du possible, se fier au poids plutôt qu'à l'âge. Ne pas utiliser plus de 3 jours pour la fièvre ou plus de 5 jours pour soulager la douleur.

Ne pas utiliser plus que la quantité recommandée.

Âge	Poids		Dose	
	(ans)	(kg)	(lb)	
<2	Moins de 10,9	Moins de 24	Utiliser les gouttes pédiatriques Advil	
2-3	10,9-15,9	24-35	1 ¼ c. à thé (6 mL)	
4-5	16,0-21,3	36-47	2 c. à thé (10 mL)	
6-8	21,4-26,7	48-59	2 ½ c. à thé (12,5 mL)	
9-10	26,8-32,5	60-71	3 c. à thé (15 mL)	
11-12	32,6-43,0	72-95	3 ¾ c. à thé (19 mL)	






# Tableau des doses d'Advil pour les enfants et les nourrissons

## Advil Junior

### Posologie habituelle :

Chacune des doses ci-dessous peut être administrée toutes les 6 à 8 heures, jusqu'à concurrence de 4 doses par jour, tant que les symptômes persistent, ou suivant les recommandations du médecin. Dans la mesure du possible, se fier au poids plutôt qu'à l'âge. Ne pas utiliser plus de 3 jours pour la fièvre ou plus de 5 jours pour soulager la douleur.

Ne pas utiliser plus que la quantité recommandée.

Âge	Poids		Dose	
	(ans)	(kg)	(lb)	
<2	Moins de 10,9	Moins de 24	Utiliser les gouttes pédiatriques Advil	
2-3	10,9-15,9	24-35	1	
4-5	16,0-21,3	36-47	1 ½	
6-8	21,4-26,7	48-59	2	
9-10	26,8-32,5	60-71	2 ½	
11-12	32,6-43,0	72-95	3	

Assurez-vous que ce produit convient à votre enfant. Lisez toujours l'étiquette et suivez le mode d'emploi.

Les renseignements fournis ci-dessus ne remplacent pas les conseils d'un médecin. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre professionnel de la santé ou votre pharmacien.

Ce site Web est destiné uniquement aux résidents du Canada. © 2026 Groupe de sociétés Haleon. Tous droits réservés. Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le Groupe de sociétés Haleon.