

# SANTÉ CANADA A ACCORDÉ UNE EXCEPTION TEMPORAIRE À L'IMPORTATION D'UNE QUANTITÉ LIMITÉE DE SUSPENSIONS D'IBUPROFÈNE ADVIL® POUR ENFANTS. SERVEZ-VOUS POUR AVOIR LA VERSION FRANÇAISE DE L'EMBALLAGE DE CES PRODUITS IMPORTÉS



## Gouttes concentrées Advil pour nourrissons

Suspension orale d'ibuprofène  
50 mg par 1,25 mL  
Analgésique / antipyrétique (AINS)  
Gouttes aromatisées au raisin blanc  
15 mL (1/2 oz liq.)  
Sans alcool

Ne pas utiliser si la pellicule plastique marquée « SAFETY SEAL » est brisée ou manquante.

Capuchon de protection à l'épreuve des enfants.

**Important : Lire tous les renseignements sur le produit avant d'utiliser. Conserver cette boîte car elle contient des renseignements importants. Ce produit est destiné aux enfants de 6 à 23 mois.**

### INFO-MÉDICAMENT

#### INGRÉDIENT ACTIF (PAR 1,25 ML)

Ibuprofène 50 mg (AINS)\*

\* anti-inflammatoire non stéroïdien

**Utilité** Antipyrétique / analgésique

### USAGES

- abaisse temporairement la fièvre
- soulage temporairement les douleurs mineures associées au rhume et à la grippe, aux maux de tête et aux maux de dents

### MISES EN GARDE

#### Alerte aux allergies :

L'ibuprofène peut provoquer une grave réaction allergique, en particulier chez les personnes allergiques à l'aspirine. Les symptômes peuvent comprendre :

- urticaire
- enflure du visage
- asthme (respiration sifflante)

- choc
- rougeurs
- éruptions cutanées
- cloques

En cas de réaction allergique, cesser l'utilisation du produit et consulter un médecin immédiatement.

**Avertissement concernant les saignements gastriques :** Ce produit contient un AINS qui peut provoquer des saignements d'estomac graves. Ce risque est accru si l'enfant :

- a des antécédents d'ulcères gastriques ou de saignement
- prend des anticoagulants ou des stéroïdes
- prend d'autres médicaments contenant un AINS sur ordonnance ou en vente libre (aspirine, ibuprofène, naproxène ou autre)
- dépasse la dose ou la durée de traitement indiquée

**Avertissement concernant les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux :** Les AINS, à l'exception de l'aspirine, accroissent le risque de crise cardiaque, d'insuffisance cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, qui peuvent être mortels. Le risque peut augmenter si la dose ou la durée de traitement indiquée sont dépassées.

#### Ne pas utiliser

- si l'enfant a déjà eu une réaction allergique à un autre analgésique / antipyrétique
- immédiatement avant ou après une chirurgie cardiaque

#### Consulter un médecin avant l'utilisation si

- l'enfant présente un risque de saignement de l'estomac
- la prise d'analgésiques ou d'antipyrétiques entraîne des problèmes ou des effets secondaires graves chez l'enfant
- l'enfant a des antécédents de problèmes gastriques, par exemple des brûlures d'estomac
- l'enfant fait de l'hypertension ou a une maladie du cœur ou des reins, une cirrhose du foie ou de l'asthme, ou a déjà eu un accident vasculaire cérébral
- l'enfant a un apport en liquides insuffisant

- l'enfant a perdu une quantité importante de liquides des suites de vomissements ou d'une diarrhée
- l'enfant prend un diurétique

#### Consulter un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si l'enfant

- est suivi par un médecin en raison d'un trouble grave
- prend un autre médicament

#### Lors de l'utilisation de ce produit

- prendre avec des aliments ou du lait en cas de maux d'estomac

#### Cesser d'utiliser et consulter un médecin si

- l'enfant présente l'un ou l'autre des signes de saignement gastrique suivants :
  - sensation d'évanouissement
  - vomissement de sang
  - selles sanguinolentes ou noirâtres
  - douleurs à l'estomac qui ne s'améliorent pas
- l'enfant a des symptômes de problèmes cardiaques ou d'accident vasculaire cérébral :
  - douleur thoracique
  - difficulté à respirer
  - faiblesse d'une partie ou d'un côté du corps
  - troubles de l'élocution
  - enflure des jambes
- l'enfant ne montre aucun signe de soulagement durant le premier jour de traitement (24 heures)

- la fièvre ou la douleur s'aggrave ou persiste plus de 3 jours
- la région douloureuse est rouge ou enflée
- de nouveaux symptômes apparaissent

**Garder hors de la portée des enfants.** En cas de surdose, obtenir des soins médicaux ou appeler un centre antipoison immédiatement.

#### MODE D'EMPLOI

- Cette étiquette ne contient pas de mode d'emploi ni d'avertissements complets pour une utilisation par les adultes.
- Ne pas dépasser la dose indiquée.
- Bien agiter avant d'utiliser.

- Consulter le tableau pour connaître la dose exacte. Si possible, déterminer la dose selon le poids, sinon, selon l'âge.
- Répéter la dose toutes les 6-8 heures, au besoin.
- Ne pas utiliser plus de 4 fois par jour.
- Mesurer avec le doseur fourni. Ne pas l'utiliser avec d'autres dispositifs.

Tableau de posologie		
Poids (lb)	Âge (ans)	Dose (mL)
Moins de 6 mois		Consulter un médecin
12-17 lb	6-11 mois	1,25 mL
18-23 lb	12-23 mois	1,875 mL

#### Autres renseignements

- Une dose dure 6-8 heures
- Conserver entre 20 °C et 25 °C (68-77 °F)
- Voir le numéro de lot et la date d'expiration sous la boîte

#### Ingrédients inactifs

acide acétique, acide citrique monohydraté, arôme artificiel, benzoate de sodium, carboxyméthylcellulose sodique, cellulose microcristalline, eau purifiée, édétate disodique, glycérine, gomme xanthane, hydroxytoluène butylé, polysorbate 80, propylène glycol, saccharose, solution de sorbitol



#### QUESTIONS OU COMMENTAIRES?

Composer sans frais 1 888-275-9938, ou consulter un pharmacien, un médecin ou un professionnel de la santé  
Rincer la seringue orale avec de l'eau du robinet seulement.  
L'effet durable réduit le nombre de doses quotidiennes nécessaires.

Pour obtenir les renseignements les plus récents sur les produits, visiter [www.Advil.com](http://www.Advil.com)

Pour obtenir les renseignements les plus récents sur les produits, visiter [www.Advil.com](http://www.Advil.com)

Dist. par : GSK CH, Warren, NJ 07059  
©2022 GSK ou son concédant de licence