



IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR

Advil Rhume et grippe

Caplets d'ibuprofène et de citrate de diphénydramine

Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie de la « monographie de produit » publiée à la suite de l'homologation d'Advil Rhume et grippe pour la vente au Canada et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet d'Advil Rhume et grippe. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

Les raisons d'utiliser ce médicament :

Advil Rhume et grippe est utilisé pour le soulagement temporaire des symptômes associés au rhume et à la grippe (influenza) :

- douleurs et courbatures
- maux de gorge
- fièvre
- maux de tête
- écoulement nasal
- larmoiement et picotements des yeux
- éternuements

Les effets de ce médicament :

L'ibuprofène soulage la douleur et abaisse la fièvre. Le citrate de diphénydramine, un antihistaminique, soulage les symptômes du rhume et de la grippe.

Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :

Vous ne devez pas utiliser ce médicament si vous :

- souffrez d'hypersensibilité ou d'une allergie à l'ibuprofène ou à d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à d'autres salicylates, à la diphénydramine, à l'un ou l'autre des ingrédients de la préparation ou aux composants du contenant (voir la section des ingrédients non médicinaux de la boîte ou la section sur la composition);
- présentez un ulcère de l'estomac actif ou récurrent, un saignement gastro-intestinal ou une maladie inflammatoire active de l'intestin (p. ex., maladie de Crohn, colite);
- avez des polypes nasaux (enflure de l'intérieur du nez) ou des manifestations allergiques comme l'asthme, l'anaphylaxie (réaction allergique soudaine et sévère, pouvant être mortelle), l'urticaire, la rhinite (congestion nasale ou écoulement nasal pouvant être causés par des allergies), des éruptions cutanées ou d'autres symptômes d'allergies;
- avez une maladie grave touchant les reins ou le foie;
- avez un taux élevé de potassium dans le sang
- prenez l'un des médicaments suivants :
 - acétaminophène;
 - AAS;
 - produits renfermant des antihistaminiques ou de la diphénydramine (p. ex., produits contre la toux et le rhume, aide-sommeil);
 - inhibiteurs de la monoamine oxydase (MAO);
 - AINS comme le naproxène et l'ibuprofène;
- souffrez de déshydratation (importante perte de liquides) causée par des vomissements, de la diarrhée ou une absorption insuffisante de liquides;
- avez des problèmes cardiaques, comme l'hypertension ou une maladie coronarienne sévère;
- êtes sur le point de subir ou avez récemment subi une chirurgie cardiaque;
- souffrez de lupus érythémateux disséminé;
- êtes au troisième trimestre de votre grossesse.

Les ingrédients médicinaux :

Ibuprofène et citrate de diphénydramine

Les ingrédients non médicinaux :

Stéarate de calcium, cire de carnauba, silice colloïdale, amidon de maïs, croscarmellose sodique, bleu n° 2 FD&C, bênélate de glycérol, hypromellose, lactose monohydraté, cellulose microcristalline, polydextrose, amidon prégélatinisé, propylène glycol, laurylsulfate de sodium, glycolate d'amidon de sodium, acide stéarique, dioxyde de titane.

La présentation :

Chaque caplet contient 200 mg d'ibuprofène et 38 mg de citrate de diphénydramine.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Mises en garde et précautions importantes

La prudence est de mise chez les patients prédisposés aux irritations du tractus gastro-intestinal, y compris ceux qui ont déjà eu des ulcères gastroduodénaux. Le risque de saignements dans l'estomac est plus élevé chez les personnes de 60 ans ou plus, celles qui ont déjà eu des ulcères d'estomac ou des troubles hémorragiques, celles qui prennent un anticoagulant (médicament qui éclaircit le sang), des corticostéroïdes, des médicaments qui contiennent un AINS comme l'AAS, l'ibuprofène ou le naproxène, ou des anti-inflammatoires sur ordonnance, et celles qui consomment 3 verres d'alcool ou plus par jour pendant qu'elles utilisent ce produit. La prudence est de mise chez les patients qui risquent de souffrir de troubles rénaux, y compris les personnes âgées et celles prenant des diurétiques. Évitez d'utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou allaitez. Cessez immédiatement d'utiliser ce produit si vous avez de la difficulté à uriner ou ressentez de la douleur lorsque vous urinez. Ce produit peut causer une somnolence importante.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT d'utiliser Advil Rhume et grippe si vous :

- présentez un ulcère de l'estomac actif ou récurrent; êtes atteint de diabète, d'un trouble thyroïdien; avez une maladie des reins légère ou modérée, une maladie du foie légère ou modérée, une maladie cardiaque, un glaucome, des troubles respiratoires ou une maladie pulmonaire chronique (comme l'asthme, l'emphysème ou la bronchite chronique), des troubles de la coagulation (comme l'hémophilie), de la difficulté à uriner en raison d'une hypertrophie de la prostate ou d'une obstruction du col vésical; avez toute autre maladie grave; prenez d'autres médicaments d'ordonnance ou en vente libre, y compris d'autres anti-inflammatoires;
- tentez de concevoir un enfant, êtes au premier ou au deuxième trimestre de votre grossesse, allaitez.

Administrer avec prudence aux personnes âgées. L'emploi prolongé continu peut accroître le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Évitez de consommer de l'alcool, de conduire un véhicule ou d'être aux commandes d'une machine lorsque vous prenez ce produit.

Consultez un médecin si la fièvre ou la douleur dure plus de 3 jours ou si les symptômes de la grippe durent plus de 5 jours.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

N'utilisez pas ce produit si vous prenez : de l'AAS à faible dose (81-325 mg) tous les jours sans avoir consulté un médecin ou un pharmacien, car l'ibuprofène peut interférer avec les bienfaits préventifs de l'AAS.

Les substances qui peuvent interagir avec Advil Rhume et grippe incluent :

- l'acétaminophène, les anticoagulants, l'apomorphine, l'alcool, la digoxine, les antidiabétiques (oraux) et l'insuline, les diurétiques, le méthotrexate, le lithium, le probénécide, la thyroxine, les antibiotiques (p. ex., la cyclosporine), la phénytoïne, les corticostéroïdes, les benzodiazépines, les médicaments contre l'hypertension, les médicaments contre la dépression, les inhibiteurs de la monoamine oxydase (MAO), les antihistaminiques (comme les médicaments contre les allergies), les tranquillisants ou autres sédatifs, les AINS (y compris le naproxène et l'ibuprofène), les aide-sommeil, les médicaments contre le rhume

N'utilisez pas de produit topique renfermant de la diphénydramine si vous prenez Advil Rhume et grippe.

Si vous prenez ou songez à prendre des médicaments d'ordonnance, dites-le à votre médecin ou à votre pharmacien.

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

Posologie habituelle :

Enfants et adultes (de 16 à 65 ans) : prendre 1 ou 2 caplets toutes les 6 heures sans dépasser 6 caplets par jour. Ne pas dépasser la dose unique ou quotidienne maximale recommandée.

Ne pas administrer aux enfants de moins de 16 ans ni aux adultes de plus de 65 ans, sauf sur l'avis d'un médecin.

Ne pas utiliser plus de 3 jours pour la fièvre ou plus de 5 jours pour la douleur et les symptômes du rhume.

Surdose :

En cas de surdose accidentelle, appelez un médecin ou un centre antipoison immédiatement, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

Continuer de prendre 1 ou 2 caplets toutes les 6 heures. Après une dose oubliée, ne pas doubler la dose recommandée.

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

Prendre avec de la nourriture ou du lait en cas de maux d'estomac.

Si des douleurs abdominales, des brûlures d'estomac, des nausées ou des vomissements, des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation, des tintements ou des bourdonnements dans les oreilles, de la nervosité, de l'insomnie, des étourdissements, des changements de la vision, de la rétention liquidienne, des essoufflements, une respiration sifflante, de la difficulté à respirer ou une sensation de serrement dans la poitrine, de l'urticaire, de l'enflure ou des démangeaisons, des éruptions cutanées, des rougeurs, des cloques, du sang dans les vomissements ou dans les selles, des selles noires, une jaunisse (jaunissement du blanc des yeux ou de la peau causé par des problèmes de foie), ou tout autre effet secondaire ou symptôme inexpliqué se manifestent pendant la prise d'Advil Rhume et grippe, cessez immédiatement l'utilisation du produit et communiquez avec un médecin.

On peut réduire le risque d'effets secondaires en prenant la dose la plus faible le moins longtemps possible.

Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. En cas d'effet inattendu ressenti lors de la prise d'Advil Rhume et grippe, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- En consultant la page Web sur la déclaration des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffer-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment déclarer un effet indésirable en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- En composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Si vous désirez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT

Conserver à la température ambiante (15-30 °C) dans un contenant hermétiquement fermé.

Garder hors de la portée des enfants. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à un enfant.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Vous pouvez obtenir ce document et la monographie complète du produit préparée pour les professionnels de la santé en communiquant avec le promoteur, GlaxoSmithKline Soins de santé aux consommateurs SRI, Mississauga, ON L5R 4B2, au : 1-888-869-9394.

GlaxoSmithKline Soins de santé aux consommateurs SRI a rédigé ce dépliant.

Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.

©2020 Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.

Dernière révision : 5 juin 2020



PAA162950 PAA162981