

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR

Advil 12 Heures

Comprimés d'ibuprofène à libération prolongée à 600 mg, BP

Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie de la « monographie de produit » publiée par suite de l'homologation d'Advil 12 Heures pour la vente au Canada et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de Advil 12 Heures. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

Les raisons d'utiliser ce médicament :

Advil 12 Heures procure un soulagement temporaire, rapide et efficace de la douleur qui dure plus de 6 heures.

Advil 12 Heures soulage la douleur causée par l'inflammation associée à des troubles tels que l'arthrite ou le surmenage physique. Les maux de tête comme les céphalées de tension et les migraines d'intensité légère ou modérée, les douleurs et les courbatures légères d'origine musculaire et articulaire, les maux de dos, les douleurs et les courbatures causées par le rhume, les maux de dents, la douleur consécutive à une extraction dentaire et les crampes menstruelles, en plus d'alléger le fièvre qui dure plus de 5 heures.

Des études cliniques ont démontré un soulagement rapide et durable de la douleur allant jusqu'à 12 heures.

Les effets de ce médicament :

Advil 12 Heures contient de l'ibuprofène, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) qui peut réduire la production par l'organisme de substances chimiques qui provoquent la douleur et l'inflammation.

Advil 12 Heures ne réduira la douleur et l'enflure que tant et aussi longtemps que vous le prenez.

Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :

Ne prenez pas Advil 12 Heures si :

- vous présentez un ulcère de l'estomac actif ou récurrent, un saignement gastro-intestinal ou une maladie inflammatoire active de l'intestin (p. ex., maladie de Crohn, colite);
- vous prenez de l'acide acétylsalicylique (AAS) ou un autre AINS, y compris un autre produit contenant de l'ibuprofène;
- vous avez une hypersensibilité ou une allergie à l'AAS, à l'ibuprofène, à d'autres salicylates, à d'autres AINS ou à l'un ou l'autre des ingrédients d'Advil 12 Heures (voir les ingrédients non médicamenteux sur la boîte ou la section sur la composition);
- vous souffrez de polypes nasaux (enflure de l'intérieur du nez), ou de manifestations allergiques comme l'asthme, l'anaphylaxie (réaction allergique soudaine et sévère, pouvant être mortelle), l'urticaire, le rhinite (congestion nasale ou écoulement nasal) pouvant être causés par des allergènes, les éruptions cutanées ou d'autres symptômes d'allergie;
- vous souffrez de désydratation (importants perte de liquides) causée par des vomissements, de la diarrhée ou une absorption insuffisante de liquides;
- vous avez reçu un diagnostic d'hypertension sévère ou avez une maladie cardiovasculaire sévère;
- vous souffrez d'une maladie grave du foie ou des reins;
- vous êtes sur le point de subir ou venez de subir une chirurgie du cœur;
- vous souffrez de lupus érythémateux disséminé;
- vous êtes au troisième trimestre de votre grossesse.

Advil 12 Heures NE doit PAS être pris par des personnes de moins de 16 ans, car la sécurité et l'efficacité de ce produit n'ont PAS été établies sans ce groupe d'âge.

L'ingrédient médicamenteux :

Ibuprofène

Les ingrédients non médicamenteux importants :

Ore de carouba, silice colloïdale, amidon de maïs, croscarmellose sodique, hypromellose, cellulose microcristalline, encre pharmaceutique, polydextrose, polyéthylène glycol, amidon préaggloméré, benzoate de sodium, acide stéarique, dioxyde de titane.

La présentation :

Disque comprimé-bouche contenant 600 mg d'ibuprofène (200 mg à libération immédiate et 400 mg à libération prolongée). La première couche se dissout rapidement pour un soulagement rapide de la douleur. La deuxième couche se dissout de façon graduelle pour un effet analgésique allant jusqu'à 12 heures. Un comprimé Advil 12 Heures fournit la même quantité de médicament que l'ibuprofène standard (à libération immédiate) à 200 mg administré toutes les 4 heures.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Mises en garde et précautions importantes

- La prudence est de mise chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque, d'hypertension ou d'une affection pouvant entraîner une accumulation excessive de liquide dans les tissus. • Prudence chez les patients présentant un risque d'infection du tractus gastro-intestinal, y compris ceux qui ont déjà eu un ulcère gastro-intestinal. Le risque de saignements dans l'estomac est plus élevé chez les personnes de 60 ans et plus, celles qui ont déjà eu des ulcères d'estomac ou des troubles hémorragiques, celles qui prennent un anticoagulant (médicament qui éclaircit le sang), un agent stéroïdien des médicaments qui contiennent un AINS comme l'acide acétylsalicylique (AAS), l'ibuprofène ou le naproxène, ou des anti-inflammatoires sur ordonnance et celles qui consomment 3 verres d'alcool ou plus par jour en même temps que ce produit.
- La prudence est de mise chez les patients présentant un risque de problèmes rénaux, notamment les personnes âgées et ceux utilisant des diurétiques. • Arrêtez immédiatement l'utilisation en cas de difficultés ou de douleurs lorsque vous urinez.
- L'utilisation lors de la grossesse ou de l'allaitement doit être évitée.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT de prendre Advil 12 Heures si :

- vous souffrez ou avez déjà souffert d'ulcères de l'estomac, de diabète, d'hypertension, d'insuffisance cardiaque, de maladie cardiaque, de maladie thyroïdienne, d'asthme, d'une maladie du foie ou des reins, de glaucome, d'un trouble de la coagulation (comme l'hémophilie) ou de toute autre maladie grave, vous êtes sous surveillance médicale pour tout problème grave, vous tentez de concevoir un enfant, vous êtes au premier ou au deuxième trimestre de votre grossesse, vous allaitez ou venez prendre d'autres médicaments, y compris des médicaments en vente libre.

Utiliser avec prudence chez les personnes âgées.

L'emploi prolongé continu peut accroître le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

N'utilisez pas ce produit si vous prenez :

- de l'AAS à forte dose (81-325 mg) tous les jours sans avoir consulté un médecin ou un pharmacien, car l'ibuprofène peut interférer avec les bénéfices préventifs de l'AAS;
- de l'AAS ou un autre médicament anti-inflammatoire.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez aussi un médicament (sur ordonnance ou en vente libre) appartenant à l'une des catégories suivantes (cette liste n'est PAS complète) : anticoagulants, anticoagulants (médicaments qui éclaircissent le sang), digoxine, antidiabétiques oraux et insuline, diurétiques, méthotrexate, lithium, médicaments à usage prolongé comme le probénécide, la thyroxine, les antibiotiques, la cyclosporine, la phényline, les corticostéroïdes ou les benzodiazépines, autres AINS, ou médicaments contre l'hypertension.

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

Posologie habituelle :

Adultes de 16 ans et plus : Prendre 1 comprimé toutes les 12 heures, au besoin. Ne pas prendre plus de 2 comprimés en 24 heures, sauf sur l'avis d'un médecin. Ne pas utiliser plus de 3 jours pour aborder la fièvre ou plus de 5 jours pour soulager la douleur. Ne pas prendre plus que la dose indiquée ni plus de 1 comprimé à la fois. Vous ne devez ni écraser, ni croquer, ni dissoudre les comprimés.

Surdose :

En cas de surdose, communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou un médecin, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

Prenez la dose oubliée dès que vous y pensez. Si l'heure de votre prochaine dose approche, attendez jusqu'à ce moment pour prendre votre médicament et ne prenez pas la dose que vous avez oubliée. Ne prenez pas deux doses en même temps.

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

En cas de maux d'estomac, prenez les comprimés avec du lait ou des aliments. Si des douleurs abdominales, des brûlures d'estomac, des nausées ou des vomissements, des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation, des frissons ou des bourdonnements dans les oreilles, de la nervosité, de l'insomnie, des étourdissements ou tout chagrinement de la vision, des démangeaisons, de la rétention de liquides, des essoufflements, une respiration sifflante, de la difficulté à respirer ou une sensation de serrement dans la poitrine, de l'urticaire, de l'enflure ou des démangeaisons, des éruptions cutanées, des rougeurs, des cloques, du sang dans les vomissements ou dans les selles, des selles noires, une jaunisse (jaunissement du blanc des yeux ou de la peau causé par des problèmes de foie), ou tout autre effet secondaire ou symptôme inhabituel se manifestent pendant la prise d'Advil 12 Heures, cessez immédiatement l'utilisation du produit et communiquez avec un médecin.

On peut réduire au minimum le risque d'effets secondaires en prenant la plus petite dose pour le plus court laps de temps possible.

Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. Pour tout effet inattendu ressenti lors de la prise d'Advil 12 Heures, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé :

- En visitant la page Web sur la déclaration des effets indésirables (<http://www.hc-sc.gc.ca/hp-mv/medprod/medprod/declare/index-eng.php>) pour savoir comment déclarer un effet indésirable en ligne, par courriel ou par télécopieur; ou
- Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Si vous désirez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT

Conserver à la température ambiante (15-30 °C). Garder hors de la portée des enfants. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour votre utilisation à un enfant.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Vous pouvez obtenir ce document et la monographie complète du produit, présentés pour les professionnels de la santé, en communiquant avec le promoteur, GlaxoSmithKline Soins de santé aux consommateurs SRI, Mississauga, ON L5R 4B2, au 1-888-276-9938 ou au www.hill.ca.

GlaxoSmithKline Soins de santé aux consommateurs SRI a rédigé ce dépliant. Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.

©2020 Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.

Dernière révision : 18 juin 2020

PA161957 PAA161958

