

### PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR

#### Advil Toux, Rhume et Grippe Nuit Ibuprofène et chlorhydrate de diphénydramine

Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie de la « monographie de produit » publiée à la suite de l'homologation d'Advil<sup>MD</sup> Toux, Rhume et Grippe Nuit pour la vente au Canada et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet d'Advil Toux, Rhume et Grippe Nuit. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

#### AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

##### Les raisons d'utiliser ce médicament :

Advil<sup>MD</sup> Toux, Rhume et Grippe Nuit est utilisé pour le soulagement temporaire des symptômes associés au rhume et à la grippe (influenza) :

- toux sèche
- éternuements
- écoulement nasal
- fièvre et frissons
- maux de tête
- douleurs et courbatures
- maux de gorge

##### Les effets de ce médicament :

Ce produit contient deux médicaments : l'ibuprofène (soulage la douleur et abaisse la fièvre) et le chlorhydrate de diphénydramine (antihistaminique et antitussif).

##### Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :

Vous ne devez pas utiliser ce médicament si :

- vous avez un ulcère gastroduodéal, des antécédents d'ulcères récurrents ou une maladie inflammatoire évolutive de l'appareil digestif;
- vous avez des polypes nasaux (enflure de l'intérieur du nez) ou vous faites de l'asthme;
- vous prenez de l'acide acétylsalicylique (AAS), de l'acétaminophène, d'autres AINS (p. ex., le naproxène) ou d'autres produits renfermant de l'ibuprofène;
- vous souffrez d'hypersensibilité ou d'une allergie connue ou soupçonnée à l'ibuprofène ou à d'autres AINS, à l'AAS ou à d'autres salicylates, à la diphénydramine ou à l'un ou l'autre des ingrédients de ce médicament;
- vous êtes enceinte.

##### Les ingrédients médicinaux :

Ibuprofène et chlorhydrate de diphénydramine

##### Les ingrédients non médicinaux :

Huile de noix de coco, rouge n° 33 D&C, bleu n° 1 FD&C, gélatine, encre pharmaceutique, polyéthylène glycol, hydroxyde de potassium, eau purifiée, sorbitane, sorbitol.

##### La présentation :

Chaque Liqui-Gel (capsule de gélatine) contient 200 mg d'ibuprofène (sous forme d'acide libre et de sel de potassium) et 25 mg de chlorhydrate de diphénydramine.

#### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

##### Mises en garde et précautions importantes

- **Provoque de la sédation ou de la somnolence. Ne pas utiliser pendant la journée.**
- La prudence est de mise chez les patients sujets à une irritation de l'appareil digestif.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT d'utiliser ce produit si :

- vous êtes atteint de diabète;
- vous avez une maladie pulmonaire chronique;
- vous êtes atteint de glaucome;
- vous avez de la difficulté à uriner en raison d'une hypertrophie de la prostate;
- vous avez une maladie auto-immune (comme le lupus);
- vous faites de l'hypertension;
- vous avez une maladie cardiaque;
- vous avez une maladie du foie ou des reins;
- vous avez une autre maladie grave;
- vous prenez d'autres médicaments d'ordonnance ou en vente libre;
- vous avez plus de 65 ans;
- vous allaitez.

Évitez de conduire un véhicule ou d'être aux commandes d'une machine lorsque vous prenez ce produit.

Consultez un médecin si le mal de gorge dure plus de deux jours.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

##### Les médicaments qui peuvent interagir avec Advil Toux, Rhume et Grippe Nuit incluent :

- les antihistaminiques, les tranquillisants, l'alcool et les autres médicaments sédatifs;
- la digoxine;
- les diurétiques (p. ex., pour le ballonnement ou les troubles cardiaques);
- l'insuline;
- le lithium;
- les médicaments contre l'hypertension ou la dépression, y compris les inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO);
- le méthotrexate;
- les antidiabétiques oraux;

- les autres analgésiques, aide-sommeil ou médicaments contre le rhume.

Ne prenez pas ce produit en même temps que d'autres médicaments renfermant des analgésiques (p. ex., ibuprofène, AAS, acétaminophène, naproxène) ou de la diphénhydramine (p. ex., médicaments contre les allergies, sédatifs, médicaments contre la toux, le rhume ou la grippe, antinauséux).

#### UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

##### Posologie habituelle :

Adultes (≥ 16 à 65 ans) : Prenez une seule dose de 1 ou 2 Liqui-Gels le soir. Ne dépassez pas la dose recommandée, sauf sur l'avis d'un médecin. Ne dépassez pas 1200 mg d'ibuprofène et 300 mg de diphénhydramine (y compris les 200-400 mg d'ibuprofène et 25-50 mg de chlorhydrate de diphénhydramine de la dose d'Advil Toux, Rhume et Grippe Nuit) en 24 heures. Ne prenez pas Advil Toux, Rhume et Grippe Nuit moins de 4-6 heures après la dernière dose d'ibuprofène ou de diphénhydramine. Voir *Interactions médicamenteuses* pour des exemples de produits qui renferment ces ingrédients. N'utilisez pas ce médicament plus de 3 nuits consécutives pour la fièvre ou plus de 5 nuits consécutives pour la douleur ou les symptômes du rhume.

Ne pas administrer aux enfants de moins de 16 ans, sauf sur l'avis d'un médecin.

##### Surdose :

**En cas de surdose, cessez d'utiliser ce produit et appelez un médecin ou un centre antipoison immédiatement, même en l'absence de symptômes.**

##### Dose oubliée :

Prendre une fois le soir, avant le coucher. Si vous oubliez de prendre une dose, ne doublez pas la dose recommandée.

#### EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

Si des brûlures d'estomac, des nausées, des vomissements, des ballonnements, de la diarrhée, de la constipation, des tintements ou des bourdonnements dans les oreilles, de la nervosité, des étourdissements, de la rétention aqueuse, ou tout autre effet indésirable ou symptôme inexpliqué se manifestent pendant la prise d'Advil Toux, Rhume et Grippe Nuit, cessez immédiatement l'utilisation du produit et communiquez avec un médecin.

N'utilisez pas de produit topique renfermant de la diphénhydramine si vous prenez Advil Toux, Rhume et Grippe Nuit.

Si vous prenez ou songez à prendre des médicaments d'ordonnance, dites-le à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET MESURES À PRENDRE

**CESSEZ D'UTILISER** ce produit et consultez immédiatement votre médecin en cas de douleurs abdominales, de réaction allergique (démangeaisons, cloques, éruptions cutanées, rougeurs, etc.), de tout changement de la vision, de sang dans les vomissements, de selles noires ou contenant du sang, de douleurs à la vessie, d'hallucinations ou de troubles d'élocution.

*Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. En cas d'effet inattendu ressenti lors de la prise d'Advil Toux, Rhume et Grippe Nuit, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.*

#### COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT

Conservez votre médicament à la température ambiante (15-30 °C).

Gardez-le hors de la portée des enfants. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à un enfant.

**POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS**

Vous pouvez obtenir ce document et la monographie complète du produit préparée pour les professionnels de la santé en communiquant avec le promoteur, Pfizer Soins de santé, une division de Pfizer Canada inc., Mississauga, ON L4Z 3M6, au : 1-888-869-9384.

Pfizer Soins de santé, une division de Pfizer Canada inc., a rédigé ce dépliant.

Monographie offerte sur demande aux médecins et aux pharmaciens.

Dernière révision : 29 janvier 2013

**DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES  
SOUÇONNÉS**

Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé au Programme Canada Vigilance de l'une des 3 façons suivantes :

- § En ligne à [www.santecanada.gc.ca/medeffet](http://www.santecanada.gc.ca/medeffet)
- § Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345
- § En remplissant un formulaire de déclaration de Canada Vigilance et en le faisant parvenir :
  - par télécopieur, au numéro sans frais 1-866-678-6789, ou
  - par la poste au :
    - Programme Canada Vigilance
    - Santé Canada
    - Indice postal 0701E
    - Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Les étiquettes préaffranchies, le formulaire de déclaration de Canada Vigilance ainsi que les lignes directrices concernant la déclaration d'effets indésirables sont disponibles sur le site Web de MedEffet<sup>MC</sup> Canada à [www.santecanada.gc.ca/medeffet](http://www.santecanada.gc.ca/medeffet).

*REMARQUE : Pour obtenir des renseignements relatifs à la gestion des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.*