

**PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE  
CONSOmmATEUR**

**Advil<sup>MD</sup> Rhume et grippe**

**Caplets d'ibuprofène et de citrate de diphénhydramine**

Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie de la « monographie de produit » publiée à la suite de l'homologation d'Advil<sup>MD</sup> Rhume et grippe pour la vente au Canada et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet d'Advil<sup>MD</sup> Rhume et grippe. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

**AU SUJET DE CE MÉDICAMENT**

**Les raisons d'utiliser ce médicament :**

Advil<sup>MD</sup> Rhume et grippe est utilisé pour le soulagement temporaire des symptômes associés au rhume et à la grippe (influenza) :

- douleurs et courbatures
- maux de gorge
- fièvre
- maux de tête
- écoulement nasal
- larmolement et picotements des yeux
- éternuements

**Les effets de ce médicament :**

L'ibuprofène soulage la douleur et abaisse la fièvre. Le citrate de diphénhydramine, un antihistaminique, soulage les symptômes du rhume et de la grippe.

**Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :**

Vous ne devez pas utiliser ce médicament si vous :

- souffrez d'hypersensibilité ou d'une allergie à l'ibuprofène ou à d'autres AINS, à l'AAS ou à d'autres salicylates, à la diphénhydramine, à l'un ou l'autre des ingrédients de la préparation ou aux composants du contenant (voir la section des ingrédients non médicinaux de la boîte ou la section sur la composition);
- avez un ulcère gastroduodéal, une maladie gastro-intestinale ou des saignements gastro-intestinaux;
- avez une maladie grave touchant les reins ou le foie;
- avez des polypes nasaux (enflure de l'intérieur du nez);
- faites de l'asthme;
- faites de l'emphysème;
- souffrez de rhinite allergique (congestion nasale ou écoulement nasal pouvant être causé par des allergies);
- prenez l'un des médicaments suivants :
  - acétaminophène;
  - acide acétylsalicylique (AAS);
  - produits renfermant des antihistaminiques ou de la diphénhydramine (p. ex., produits contre la toux et le rhume, aide-sommeil);
  - inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO);
  - anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

comme le naproxène et l'ibuprofène;

- êtes déshydraté (importante perte de liquides);
- avez des problèmes cardiaques, comme l'hypertension ou une maladie coronarienne sévère;
- souffrez de lupus érythémateux disséminé;
- êtes enceinte ou allaitez.

**Les ingrédients médicinaux :**

Ibuprofène et citrate de diphénhydramine

**Les ingrédients non médicinaux :**

Stéarate de calcium, cire de carnauba, silice colloïdale, amidon de maïs, croscarmellose sodique, bleu n° 2 FD&C, béhénate de glycérol, hypromellose, lactose monohydraté, cellulose microcristalline, polydextrose, amidon prégélatinisé, propylèneglycol, laurylsulfate de sodium, glycolate d'amidon de sodium, acide stéarique, dioxyde de titane.

**La présentation :**

Chaque caplet contient 200 mg d'ibuprofène et 38 mg de citrate de diphénhydramine.

**MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS**

**Mises en garde et précautions importantes**

La prudence est de mise chez les patients sujets à une irritation de l'appareil digestif.

La prudence est de mise chez les patients qui risquent de souffrir de troubles rénaux, y compris les personnes âgées et celles prenant des diurétiques.

Évitez d'utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou allaitez.

Cessez immédiatement d'utiliser ce produit si vous avez de la difficulté à uriner ou ressentez de la douleur lorsque vous urinez.

Ce produit peut causer une somnolence importante.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien **AVANT** d'utiliser Advil<sup>MD</sup> Rhume et grippe si vous :

- êtes atteint de diabète;
- être atteint d'un trouble thyroïdien
- vous avez une maladie des reins légère ou modérée;
- vous avez une maladie du foie légère ou modérée;
- vous avez des troubles respiratoires ou une maladie pulmonaire chronique (comme la bronchite chronique);
- vous avez des troubles de la coagulation (comme l'hémophilie);
- avez de la difficulté à uriner en raison d'une hypertrophie de la prostate;
- prenez d'autres médicaments d'ordonnance ou en vente libre, y compris d'autres anti-inflammatoires.

Évitez de consommer de l'alcool, de conduire un véhicule ou d'être aux commandes d'une machine lorsque vous prenez ce produit. Administrer avec prudence aux personnes âgées.

Consultez un médecin si la fièvre ou la douleur dure plus de 3 jours ou si les symptômes de la grippe durent plus de 5 jours.

## **INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Ne prenez pas ce produit si vous prenez de l'AAS.

Les substances qui peuvent interagir avec Advil<sup>MD</sup> Rhume et grippe incluent :

- l'acétaminophène
- les anticoagulants
- l'apomorphine
- l'alcool
- la digoxine
- les antidiabétiques (oraux) et l'insuline
- les diurétiques
- le méthotrexate
- le lithium
- le probénécide
- la thyroxine
- les antibiotiques (p. ex., la cyclosporine)
- la phénytoïne
- les corticostéroïdes
- les benzodiazépines
- les médicaments contre l'hypertension
- les médicaments contre la dépression
- les inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO)
- les antihistaminiques (comme les médicaments contre les allergies)
- les tranquillisants ou autres sédatifs
- les AINS (y compris le naproxène et l'ibuprofène)
- les aide-sommeil
- les médicaments contre le rhume

N'utilisez pas de produit topique renfermant de la diphénhydramine si vous prenez Advil<sup>MD</sup> Rhume et grippe.

Si vous prenez ou songez à prendre des médicaments d'ordonnance, dites-le à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT**

### **Posologie habituelle :**

Adultes (≥ 16 à ≤ 65 ans) : prendre 1 ou 2 caplets toutes les 6 heures sans dépasser 6 caplets par jour. Ne pas dépasser la dose unique ou quotidienne maximale recommandée.

Ne pas administrer aux enfants de moins de 16 ans ni aux adultes de plus de 65 ans, sauf sur l'avis d'un médecin.

Ne pas utiliser plus de 3 jours pour la fièvre ou plus de 5 jours pour la douleur et les symptômes du rhume.

### **Surdose :**

**En cas de surdose accidentelle, appelez un médecin ou un centre antipoison immédiatement, même en l'absence de symptômes.**

### **Dose oubliée :**

Continuer de prendre 1 ou 2 caplets toutes les 6 heures. Après une dose oubliée, ne pas doubler la dose recommandée.

## **EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE**

Si des douleurs abdominales, des brûlures d'estomac, des nausées ou des vomissements, des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation, des tintements ou des bourdonnements dans les oreilles, de la nervosité, de l'insomnie, des étourdissements, des changements de la vision, de la rétention liquidienne, des démangeaisons, des éruptions cutanées, des rougeurs, des cloques, du sang dans les vomissements, des selles noires ou du sang dans les selles, ou tout autre effet indésirable ou symptôme inexpliqué se manifestent pendant la prise d'Advil<sup>MD</sup> Rhume et grippe, cessez immédiatement l'utilisation du produit et communiquez avec un médecin.

On peut réduire le risque d'effets secondaires en prenant la dose la plus faible le moins longtemps possible.

*Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. En cas d'effet inattendu ressenti lors de la prise d'Advil Rhume et grippe, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.*

## **COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT**

Conserver à la température ambiante (15-30 °C) dans un contenant hermétiquement fermé.

Garder hors de la portée des enfants. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à un enfant.

### **DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SOUPÇONNÉS**

Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé au Programme Canada Vigilance de l'une des 3 façons suivantes :

- En ligne à [www.santecanada.gc.ca/medeffet](http://www.santecanada.gc.ca/medeffet)
- Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345
- En remplissant un formulaire de déclaration de Canada Vigilance et en le faisant parvenir :
  - par télécopieur, au numéro sans frais 1-866-678-6789, ou
  - par la poste au :  
Programme Canada Vigilance  
Santé Canada  
Indice postal 0701D  
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Les étiquettes préaffranchies, le formulaire de déclaration de Canada Vigilance ainsi que les lignes directrices concernant la déclaration d'effets indésirables sont disponibles sur le site Web de MedEffet<sup>MC</sup> Canada à [www.santecanada.gc.ca/medeffet](http://www.santecanada.gc.ca/medeffet).

*REMARQUE : Pour obtenir des renseignements relatifs à la gestion des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.*

### **POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS**

Vous pouvez obtenir ce document et la monographie complète du produit préparée pour les professionnels de la santé en communiquant avec le promoteur, Pfizer Soins de santé, une division de Pfizer Canada inc., Mississauga, ON L4Z 3M6, au : 1-888-869-9384.

Pfizer Soins de santé, une division de Pfizer Canada inc., a rédigé ce dépliant.

Dernière révision : 22 juin 2011