

**Advil^{MD} Rhume et Sinus Liqui-Gels^{MD}
Ibuprofène et chlorhydrate de pseudo-éphédrine liqui-gels.**

Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie d'une « monographie de produit » publiée à la suite de l'approbation de la vente au Canada d'Advil Rhume et Sinus Liqui-Gels et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet d'Advil Rhume et Sinus Liqui-Gels. Pour toute information complémentaire au sujet de ce médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

Les raisons d'utiliser ce médicament :

Soulagement rapide et efficace des symptômes du rhume, notamment les maux de gorge, les douleurs aux sinus, la congestion nasale, les maux de tête, la fièvre, les douleurs et les courbatures.

Les effets de ce médicament :

L'ibuprofène soulage la douleur et la fièvre. Le chlorhydrate de pseudo-éphédrine est un décongestionnant nasal.

Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :

Ne prenez pas d'Advil Rhume et Sinus Liqui-Gels si vous :

- êtes allergique/hypersensible à l'acide acétylsalicylique (AAS), à l'ibuprofène, à d'autres salicylates, à tout autre médicament anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), à la pseudo-éphédrine, à toute autre amine sympathomimétiques ou à un ingrédient d'Advil Rhume et Sinus Liqui-Gels (reportez-vous à la section relative aux ingrédients non médicinaux de cette documentation);
- souffrez d'ulcère de l'estomac actif ou récurrent, d'hémorragie gastro-intestinale ou d'une maladie intestinale inflammatoire active (p. ex., maladie de Crohn, colite);
- prenez des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO, entre autres contre la dépression ou la maladie de Parkinson) ou pendant 14 jours suivant l'arrêt de la prise de médicaments de type IMAO, de l'AAS ou autres AINS, y compris tout autre produit contenant de l'ibuprofène;
- présentez des polypes nasaux (enflure de l'intérieur du nez);
- êtes asthmatique;
- présentez des manifestations allergiques, telles que l'anaphylaxie (réaction allergique subite pouvant être fatale), de l'urticaire, une rhinite (nez bouché ou écoulement nasal pouvant être dû à des allergies), une éruption cutanée ou d'autres symptômes allergiques;
- êtes déshydraté (perte de fluide importante) en raison de

vomissements, de diarrhée ou d'une ingestion insuffisante de fluides;

- avez reçu un diagnostic d'hypertension artérielle sévère ou souffrez d'une maladie cardiaque;
- êtes sur le point de subir une chirurgie cardiaque ou venez d'en subir une;
- êtes atteint d'une maladie du foie grave;
- êtes atteint d'une maladie des reins sévère;
- êtes atteint d'une maladie de la thyroïde;
- êtes atteint du syndrome de Raynaud (un trouble de l'appareil circulatoire);
- êtes atteint de lupus érythémateux systémique;
- êtes enceinte ou allaitez.

Les ingrédients médicinaux sont :

Ibuprofène (sous forme d'acide libre et de sel de potassium) et chlorhydrate de pseudo-éphédrine.

Les ingrédients non médicinaux sont :

D&C jaune n° 10, FD&C rouge n° 40, huile de coco fractionnée, gélatine, encre pharmaceutique, polyéthylène glycol, hydroxyde de potassium, eau purifiée, sorbitane, sorbitol.

Les formes posologiques sont :

Chaque liqui-gel contient 200 mg d'ibuprofène (sous forme d'acide libre et de sel de potassium) et 30 mg de chlorhydrate de pseudo-éphédrine.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Mises en garde et précautions importantes

- **Prudence chez les patients présentant un risque d'irritation du tractus gastro-intestinal.**
- **Patients présentant un risque de problèmes rénaux, notamment les personnes âgées et ceux utilisant des diurétiques.**
- **L'utilisation lors de la grossesse ou de l'allaitement doit être évitée.**
- **Arrêtez immédiatement l'utilisation en cas de difficultés ou de douleurs lorsque vous urinez.**

AVANT de prendre Advil Rhume et Sinus Liqui-Gels, consultez votre médecin ou votre pharmacien si :

- vous souffrez d'un trouble de la coagulation du sang (tel que l'hémophilie);
- vous souffrez de problèmes respiratoires ou de maladies pulmonaires chroniques (telles que la bronchite chronique);
- vous êtes diabétique;
- vous avez des difficultés à uriner en raison d'une hypertrophie de la prostate;
- vous avez un glaucome;

- vous souffrez d'hypertension artérielle;
- vous êtes atteint d'une maladie des reins légère ou modérée;
- vous êtes atteint d'une maladie du foie légère ou modérée;
- vous êtes atteint de toute autre maladie grave, êtes sous les soins d'un médecin pour un problème grave ou prenez un autre médicament, notamment des médicaments en vente libre.

INTERACTIONS AVEC LE MÉDICAMENT

N'utilisez pas ce produit si vous prenez :

- un IMAO ou si vous avez arrêté d'en prendre au cours des deux dernières semaines;
- de l'AAS ou d'autres anti-inflammatoires ou médicaments contre la douleur.

Les médicaments pouvant interagir avec Advil Rhume et Sinus Liqui-Gels sont les suivants :

- Acétaminophène
- Acide acétylsalicylique (AAS)
- Médicaments contre les allergies
- Anticoagulants (médicaments pour éclaircir le sang)
- Antidépresseurs
- Antihypertenseurs (médicaments contre l'hypertension artérielle)
- Antibiotiques (lévofloxacine)
- Benzodiazépines
- Médicaments contre le rhume
- Corticostéroïdes
- Cyclosporine
- Médicaments contre le diabète (notamment l'insuline et les agents antidiabétiques oraux)
- Digoxine
- Diurétiques (pilules pour éliminer le surplus d'eau)
- Lithium
- Méthotrexate
- Inhibiteurs de la monoamine-oxydase
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS); notamment le naproxène et l'ibuprofène
- Phénytoïne
- Probénécide
- Thyroxine

Informez votre médecin ou votre pharmacien des médicaments que vous prenez ou que vous prévoyez de prendre.

Ne fumez pas et ne buvez pas d'alcool lorsque vous prenez ce produit.

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

Dose habituelle :

Adultes de moins de 65 ans et enfants de plus de 12 ans : Prenez 1 ou 2 liqui-gels toutes les 4 à 6 heures, selon les besoins. Ne dépassez pas 6 liqui-gels en 24 heures, sauf sur l'avis d'un médecin.

Ne donnez pas ce médicament aux enfants de moins de 12 ans, sauf sur l'avis d'un médecin. Ne prenez pas ce médicament pendant plus de 3 jours pour une fièvre ou pendant plus de 5 jours pour soulager la douleur ou des symptômes du rhume.

Surdose :

En cas de surdose, appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin, même s'il n'y a aucun symptôme.

Dose oubliée :

Selon les besoins, continuez de prendre 1 ou 2 liqui-gels toutes les 4 à 6 heures si vous avez oublié de prendre une dose. Ne prenez pas deux fois la dose recommandée si vous avez oublié de prendre une dose.

PROCÉDURES À SUIVRE EN CE QUI CONCERNE LES EFFETS SECONDAIRES

Advil Rhume et Sinus Liqui-Gels peut parfois produire des effets secondaires indésirables, tels que des brûlures d'estomac, une constipation, la nausée, un ballonnement, la nervosité ou l'insomnie.

Arrêtez l'utilisation et consultez un médecin ou un pharmacien si les symptômes s'aggravent ou persistent.

Le risque d'avoir des effets secondaires peut être réduit en utilisant la plus petite dose pendant la plus courte période.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET PROCÉDURES À SUIVRE

Symptôme/Effet	Consultez votre médecin ou pharmacien		Obtenez immédiatement des soins médicaux d'urgence
	En cas d'effet sévère	Dans tous les cas	
Occasionnel	Symptômes d'une réaction allergique, notamment : éruption cutanée, démangeaisons/rougeurs sévères, cloques, gonflement ou difficulté à respirer		T
	Sang dans les vomissures, selles sanglantes ou noires		T
	Douleur abdominale, vomissements, diarrhée	T	
	Acouphène ou bourdonnement dans les oreilles/vertiges	T	
	Altération de la vue	T	
	Rétention d'eau	T	

Cette liste d'effets indésirables n'est pas exhaustive. Si vous observez des effets inattendus lorsque vous prenez Advil Rhume et Sinus Liqui-Gels, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

DÉCLARATION DES EFFETS SECONDAIRES

La déclaration de tout effet secondaire grave ou imprévu à Santé Canada peut contribuer à améliorer l'utilisation sécuritaire des produits de santé par les Canadiens. Votre déclaration peut permettre d'identifier d'autres effets secondaires et de faire changer les renseignements relatifs à la sécurité du produit.

Trois façons de déclarer :

- Aller sur le site Web de MedEffet (<http://hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/index-fra.php>);
- Composer le 1-866-234-2345 (sans frais); ou
- Remplir un formulaire de déclaration des effets secondaires du consommateur et le faire parvenir :
 - par télécopieur : 1-866-678-6789 (sans frais)
 - par la poste au :

Programme Canada Vigilance
Santé Canada
Indice postal : 0701E
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Des étiquettes préaffranchies et le formulaire sont disponibles sur le site Web de MedEffet, à l'adresse <http://hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/index-fra.php>.

Remarque : si vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur la prise en charge d'un effet secondaire, prière de communiquer avec votre professionnel de la santé. Le programme Canada Vigilance ne donne aucun conseil médical.

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT

Conserver à une température ambiante (15 à 30 °C).

Garder hors de portée des enfants. La quantité de médicaments contenue dans cet emballage est suffisante pour causer de graves torts à un enfant.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Pour obtenir ce document et la monographie complète du

produit, rédigés pour les professionnels de la santé,
communiquez avec le promoteur, Pfizer Soins de santé, une
division de Pfizer Canada inc., Mississauga, ON L4Z 3M6, au :
1-888-275-9938 ou à l'adresse www.advil.ca.

Liqui-Gels^{MD} est une marque déposée de Catalent Pharma
Solutions.

Pfizer Soins de santé, une division de Pfizer Canada inc. a rédigé
ce dépliant.

La monographie du produit est à la disposition des médecins et
des pharmaciens qui en font la demande.

Dernière révision : 6 novembre 2015